



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (KINSHASA)

Résultats de l'enquête transversale de la Phase 2

Novembre–Février 2021

PRINCIPAUX RÉSULTATS

L'implant est la méthode la plus utilisée par les femmes en union et la contraception d'urgence, la méthode la plus utilisée par les femmes non mariées mais sexuellement actives.

Le pourcentage de femmes qui déclarent que leur dernière grossesse ou naissance n'était pas désirée est passé de 49% en 2020 à 61% en 2021.


La rupture de stock en pilule et préservatifs masculins dans les sites de prestations de santé publics s'est accentuée en 2021 et a été plus fréquente dans les sites de prestations de santé publics que dans les sites de prestations de santé privés.

SECTION 1 : UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, DYNAMIQUE ET DEMANDE CONTRACEPTIVE

PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE MODERNE


Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive moderne (TPCm) par statut matrimonial

1,7%
d'augmentation annuelle moyenne de TPCm chez toutes les femmes




TAUX DE PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE PAR TYPE DE MÉTHODES

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive, par type de méthode (n=2 369)




TENDANCES DANS LA DISTRIBUTION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES MODERNES

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent des méthodes contraceptives modernes, par méthode et par année (PMA Phase 2 n=630)




DISTRIBUTION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES MODERNES

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes contraceptives modernes âgées de 15-49 ans, par méthode et par statut matrimonial



UTILISATION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES, BESOINS NON SATISFAITS ET DEMANDE CONTRACEPTIVE SATISFAITE PAR UNE MÉTHODE MODERNE

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-19 ans qui utilisent une méthode contraceptive par type de méthodes, pourcentage de celles ayant les besoins non satisfaits, et pourcentage de celles ayant une demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne (PMA Phase 2 n=2 369)



La demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne est le quotient de l'utilisation des méthodes contraceptives modernes par la somme des besoins non satisfaits et de l'utilisation contraceptive totale.


INTENTION D'UTILISER LA CONTRACEPTION AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui n'utilisent pas actuellement une méthode contraceptive, mais qui ont l'intention d'en utiliser au cours des 12 prochains mois (n=1 182)



INTENTION DE LA NAISSANCE LA PLUS RÉCENTE / LA GROSSESSE ACTUELLE

Distribution (pourcentage) des femmes selon l'intention de leur dernière naissance ou leur grossesse actuelle (n=841)




PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 1 : UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, DYNAMIQUES ET DEMANDE CONTRACEPTIVE

- Il y a une augmentation de l'utilisation de la contraception d'urgence parmi les femmes en âge de procréer de la ville de Kinshasa. La prévalence est passée de 23 % à 31% entre 2020 et 2021.
- Près d'une non-utilisatrice sur six (16%) a l'intention d'utiliser une méthode contraceptive au cours des 12 prochains mois.
- Six femmes sur dix ont déclaré que leur dernière naissance ou grossesse n'était pas désirée. En 2021, 54% femmes ont déclaré que leur dernière grossesse ou naissance était désirée mais plus tard alors que 7% ne désiraient plus du tout avoir des enfants.

SECTION 2 : CONSEIL ET SENSIBILISATION AUX UTILISATRICES DE LA CONTRACEPTION

INDICE INFORMATION MÉTHODE PLUS (IMI+)

Pourcentage de femmes qui ont été conseillées sur les effets secondaires, sur que faire en cas d'effets secondaires, sur d'autres méthodes et sur la possibilité de changer de méthode (n=554)




Pourcentage de femmes qui ont répondu « Oui » à toutes les quatre questions



A DISCUTÉ DE LA PF AVEC UN PRESTATAIRE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Pourcentage de femmes qui ont reçu des informations sur la PF d'un prestataire ou d'un agent de santé communautaire, par âge



PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 2 : QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF ET DU COUNSELING


- Seule une femme sur cinq (21%) a reçu d'informations complètes lorsqu'elles ont reçu des services de PF
- Une femme sur cinq avait discuté de la PF avec un prestataire au cours des 12 derniers mois. Les adolescentes sont encore moins susceptibles que les femmes plus âgées d'avoir eu ces discussions.

SECTION 3 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES AU SEIN DU COUPLE

IMPLICATION DU PARTENAIRE DANS LES DÉCISIONS CONCERNANT LA PF

Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode moderne sous le contrôle de la femme et qui sont d'accord avec les déclarations suivantes, par âge et par éducation (n=424)

Votre partenaire sait-il que vous utilisez cette méthode ?



Par âge




Par éducation




Les méthodes modernes sous le contrôle de la femme incluent toutes les méthodes modernes sauf la stérilisation masculine et les préservatifs masculins

Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode moderne sous le contrôle de la femme et qui sont d'accord avec la déclaration suivante, par âge et par éducation (n=424)


Avant de commencer à utiliser la méthode actuelle, avez-vous discuté de la décision de retarder ou d'éviter la grossesse avec votre partenaire ?



Par âge




Par éducation



Les méthodes modernes sous le contrôle de la femme incluent toutes les méthodes modernes sauf la stérilisation masculine et les préservatifs masculins


Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode PF et qui sont d'accord avec la déclaration suivante, par âge et par éducation (n=1 228)

Diriez-vous que la décision d'utiliser la contraception était principalement la vôtre ?




- Décision prise principalement par l'enquêtee
- Décision prise principalement par le mari/conjoint
- Décision prise ensemble
- Autre


Par âge




Par éducation




Diriez-vous que la décision de ne pas utiliser une méthode contraceptive était principalement la vôtre ?



Par âge




Par éducation




COERCITION LIÉE À LA GROSSESSE

Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire a essayé de les forcer ou de faire pression sur elles pour qu'elles tombent enceintes dans les 12 derniers mois (n=1 037)



Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire leur a fait se sentir mal pour avoir voulu utiliser une méthode contraceptive pour retarder ou éviter une grossesse au cours des 12 derniers mois (n=1 037)



Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire a déclaré qu'il les quitterait si elles ne tombaient pas enceintes au cours des 12 derniers mois (n=1 037)



Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire leur a retiré sa méthode contraceptive ou l'a empêchée d'aller en clinique au cours des 12 derniers mois (n=1 037)




PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 3: DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES AU SEIN DU COUPLE

- Parmi les femmes qui utilisent actuellement une méthode contraceptive moderne sous le contrôle de la femme, sept sur dix ont déclaré que leur partenaire était au courant de la méthode qu'elle utilise. Ce pourcentage était encore plus important parmi les femmes ayant un niveau d'étude universitaire.
- Plus de la moitié des utilisatrices (55%) ont déclaré que la décision d'utiliser la contraception était prise conjointement avec le partenaire. Alors que plus de sept non-utilisatrices sur dix (77%) ont pris seule la décision de ne pas utiliser une méthode contraceptive.
- Huit pour cent de femmes en union ont déclaré que leur partenaire a essayé de les forcer ou de faire pression sur elles pour qu'elles tombent enceintes dans les 12 derniers mois. Alors que 4% ont déclaré que leur partenaire leur a retiré la méthode contraceptive ou l'a empêchée d'aller en clinique au cours des 12 derniers mois.


SECTION 4 : SITES DE PRESTATIONS DE SANTÉ

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : DIU

Sites de prestations de santé publics
(PMA Phase 2 n=21)




Sites de prestations de santé privés
(PMA Phase 2 n=116)




- Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois
- Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois
- Méthode actuellement en rupture de stock
- Méthode non offerte

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : IMPLANT

Sites de prestations de santé publics
(PMA Phase 2 n=21)




Sites de prestations de santé privés
(PMA Phase 2 n=116)




- Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois
- Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois
- Méthode actuellement en rupture de stock
- Méthode non offerte

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : INJECTABLE

Sites de prestations de santé publics
(PMA Phase 2 n=21)



Sites de prestations de santé privés
(PMA Phase 2 n=116)



● Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois


● Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois

● Méthode actuellement en rupture de stock


● Méthode non offerte

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : PILULE

Sites de prestations de santé publics
(PMA Phase 2 n=21)



Sites de prestations de santé privés
(PMA Phase 2 n=116)



● Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois


● Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois

● Méthode actuellement en rupture de stock


● Méthode non offerte

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : PRÉSERVATIF MASCULIN

Sites de prestations de santé publics (PMA Phase 2 n=21)



Sites de prestations de santé privés (PMA Phase 2 n=116)



- Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois
- Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois
- Méthode actuellement en rupture de stock
- Méthode non offerte

PRINCIPALES RAISONS DES ÉPISODES DE RUPTURES DE STOCK DE TOUTE MÉTHODE PAR TYPE D'ÉTABLISSEMENT

Sites de prestations de santé publics (n=51)



78%
Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés



22%
Autres raisons

Sites de prestations de santé privés (n=179)



53%
Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés




15%
Les produits n'ont pas été commandés


Réponses possibles ont été: « Les produits n'ont pas été commandés », « Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés », « Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante », « Les produits ont été commandés mes livrés en quantité insuffisante », « Une augmentation inattendue de la consommation », « Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19 » et « Autre ».

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

Pourcentage de sites de prestation de santé qui offrent les implants et qui ont un prestataire formé et les instruments / matériels nécessaires pour l'insertion / le retrait d'implants (n=81)



Pourcentage d'établissements qui offrent le DIU et qui ont un prestataire formé et les instruments / matériels nécessaires pour l'insertion / le retrait du DIU (n=59)



28%

d'utilisatrices d'une méthode contraceptive moderne l'ont obtenu auprès d'un site de prestation de santé public (n=575)

PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 4 : SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

- La rupture de stock en contraceptifs dans les sites de prestations de santé publique a été très marquée en 2021 comparée à l'année 2020.
- La principale raison de rupture évoquée est que les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés.
- Près de huit sites de prestation de santé sur dix qui offrent les implants, disposent d'un prestataire formé et sont équipés pour les insérer et les retirer.

TABLEAUX : LA PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE ET LES BESOINS NON SATISFITS

TOUTES LES FEMMES				TPC				TPCm				Besoins non satisfaits de PF			
Source de données	Vague / phase	Collecte de données	Échantillon des femmes	TPC%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance		TPCm%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance		Besoins non satisfaits (%)	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	
PMA 2020	V1	Oct-Jan 2014	2 129	33,22	1,26	30,75	35,79	16,24	0,95	14,42	18,24	17,65	0,92	15,89	19,56
PMA 2020	V2	Aug-Sept 2014	2 860	30,35	2,14	26,24	34,80	15,98	1,30	13,55	18,74	22,36	1,41	19,67	25,29
PMA 2020	V3	Mai-Juin 2015	2 665	34,20	2,33	29,71	38,99	16,92	1,72	13,75	20,64	20,08	1,50	17,25	23,25
PMA 2020	V4	Oct-Jan 2016	2 733	42,32	1,86	38,65	46,09	20,94	1,53	18,04	24,17	16,00	1,52	13,2	19,27
PMA 2020	V5	Aug-Oct 2016	2 582	42,28	2,29	37,79	46,90	20,89	1,31	18,39	23,63	14,57	1,77	11,38	18,47
PMA 2020	V6	Aug-Nov 2017	2 568	40,50	2,18	36,23	44,91	22,01	2,52	17,40	27,43	15,75	1,74	12,59	19,54
PMA 2020	V7	Oct-Nov 2018	2 583	46,62	2,10	42,44	50,84	26,54	1,86	22,98	30,43	14,95	2,59	10,49	20,85
PMA	Phase 1	Dec-Fev 2020	2 611	43,61	1,58	40,47	46,8	24,48	1,40	21,78	27,40	10,67	0,93	8,94	12,69
PMA	Phase 2	Nov-Fev 2021	2 369	45,26	2,08	41,14	49,45	27,29	1,74	23,96	30,91	11,39	1,24	9,14	14,11

FEMMES EN UNION				TPC				TPCm				Besoins non satisfaits de PF			
Source de données	Vague / phase	Collecte de données	Échantillon des femmes	TPC%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance		TPCm%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance		Besoins non satisfaits (%)	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	
PMA 2020	V1	Oct-Jan 2014	1 073	38,83	1,98	34,95	42,85	18,86	1,62	15,83	22,32	31,07	1,43	28,28	34,01
PMA 2020	V2	Aug-Sept 2014	1 396	35,64	2,52	30,77	40,83	20,26	1,76	16,97	23,99	33,34	2,05	29,38	37,55
PMA 2020	V3	Mai-Juin 2015	1 200	42,24	2,99	36,41	48,29	20,39	2,27	16,22	25,30	31,37	2,24	27,07	36,02
PMA 2020	V4	Oct-Jan 2016	1 173	50,22	2,59	45,06	55,37	23,78	1,83	20,31	27,63	25,60	2,34	21,22	30,54
PMA 2020	V5	Aug-Oct 2016	1 190	49,90	3,38	43,20	56,61	23,40	2,18	19,34	28,03	22,58	2,90	17,33	28,88
PMA 2020	V6	Aug-Nov 2017	1 166	47,33	2,83	41,75	52,99	26,70	4,12	19,34	35,63	24,77	2,07	20,87	29,13
PMA 2020	V7	Oct-Nov 2018	1 197	51,26	3,22	44,85	57,63	27,37	2,21	23,19	32,00	23,52	3,78	16,84	31,83
PMA	Phase 1	Dec-Fev 2020	1 159	54,65	2,20	50,24	59,00	29,63	2,40	25,07	34,63	15,60	1,21	13,33	18,18
PMA	Phase 2	Nov-Fev 2021	1 044	54,93	1,96	50,98	58,82	30,33	2,11	26,29	34,69	17,62	1,66	14,55	21,18

Dans la province de Kinshasa, PMA République Démocratique du Congo collecte des informations sur les connaissances, les pratiques et la couverture des services de planification familiale dans 58 zones de dénombrement en utilisant un plan de sondage en grappes à deux étages, au niveau urbain. Les résultats sont représentatifs au niveau provincial. Les données de l'enquête de la Phase 2 de PMA ont été collectées entre novembre 2020 et février 2021 auprès de 1 866 ménages (avec un taux de réponse de 95,1%), 2 369 femmes âgées de 15-49 ans (taux de réponse : 93%), et 204 sites de prestations de santé (taux de réponse : 98,5%). Pour obtenir des informations sur l'échantillonnage et des ensembles de données complets, consultez le site <https://www.pmadata.org/countries/democratic-republic-congo>.

Les pourcentages présentés dans ce brief ayant été arrondis et le total peut ne pas correspondre à 100%.

PMA utilise la technologie mobile et des enquêtrices résidentes pour la collecte de données afin de réaliser rapidement des enquêtes de suivi des indicateurs clés de la planification familiale et de la santé en Afrique et en Asie. PMA République Démocratique du Congo est dirigé par l'École de Santé Publique de l'Université de Kinshasa. La stratégie et l'appui global sont fournis par l'Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction de l'Université de Johns Hopkins et Jhpiego. Les financements proviennent de la Fondation Bill & Melinda Gates.